

Quem rastrear

Mulheres sexualmente ativas com idade ≥ 25 anos

Como rastrear

Colpocitologia oncótica (CO) = Papanicolau

Frequência

Uma vez ao ano. Após dois negativos consecutivos, a cada 3 anos.

Até quando

64 anos

É necessário ter 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos para interromper o rastreio.

Situações Especiais

Sem atividade sexual Não precisa rastrear

Pós-menopausa Estrogenizar antes de colher

Gestante Mesma rotina da não grávida. Período visto como uma janela de oportunidade.

Histerectomizada Não precisam continuar o rastreio se histerectomia total por doença benigna e sem história de lesão de alto grau.

Imunossuprimida Inicia a coleta logo após a sexarca

Semestral; após dois negativos consecutivos, passa a ser anual

Se HIV + com CD4 < 200, coleta semestral

Qualquer alteração na colpocitologia → colposcopia

Alterações da Citologia Oncótica

Alteração Conduta

ASC-US < 25 anos → repetir em 3 anos

25-29 anos → repetir em 1 ano

≥ 30 anos → repetir em 6 meses

LSIL < 25 anos → repetir em 3 anos

≥ 25 anos → repetir em 1 ano

ASC-H Colposcopia

HSIL Colposcopia

Alterações da Citologia Oncótica (cont)

Adenoma *in situ* Colposcopia

Adenoma invasor Colposcopia

AGC Colposcopia + coleta endocervical

Qualquer atipia em imunossuprimida → colposcopia

2 ASC-US consecutivos → colposcopia

2 LSIL consecutivos → colposcopia

Colposcopia

Principais achados maiores Epitélio acetobranco denso

Pontilhado grosseiro

Mosaico grosseiro

Achado compatível CO e Colposcopia (alto grau + achado maior) Ver e Tratar → Exérese de ZT*

Exérese de ZT Tipo 1 - Ectocervical; visível

Tipo 2 - Ecto e endocervical; visível

Tipo 3 - Ecto e endocervical; não completamente visível

*ZT = Zona de Transformação

Seguimento pós-conização

Resultado Seguimento

Margens livres ou NIC I Colpocitologia + Colposcopia semestral por 1 ano

Tudo negativo → Volta para UBS → Colpocitologia anual por 5 anos

Tudo negativo → Volta para rotina

Margens comprometidas Colpocitologia + Colposcopia semestral por 2 anos

Tudo negativo → Volta para UBS → Colpocitologia anual por 5 anos

Tudo negativo → Volta para rotina