

Fármacos	
Osmóticos	Manitol Glicerina e isorbide: raro
Diuréticos de ansa	Furosemida Torasemida Bumetanida Ácido etacrínico
Inibidores da anidrase Carbónica	Acetazolamida Metazolamida Diclorofenamida Brinzolamida e Dorzolamida » glaucoma
Tiazidas	Clorotiazida hidroclorotiazida derivados de sulfas: - metolazona; indapamida; clortalidona
Poupadores de K	1) amilorido; triant-ereno 2) espironalactona e esplerenona

Osmóticos	
Efeitos	Perda de água > Perda de Na ou K Aumentam fluxo sanguíneo renal Comprometem capacidade de concentração de urina Aumento da osmolalidade plasmática*

Osmóticos (cont)	
Mecanismo de ação	Moléculas que funcionam como partículas osmóticas promovendo a excreção de Na ⁺ , H ₂ O, K, Cl, e HCO ₃ .
Não interferem diretamente com reabsorção tubular de Na * ocorre por dois mecanismos: déficit de H ₂ O e hipernatrémia (consequência da diurese osmótica) e retenção do manitol hipertônico por Insuf renal » água passa para o componente extracelular » risco de hiponatremia por diluição (mesmo com hiperosmolalidade)	

Inibidores Anidrase Carbónica	
Local de ação	Tubo proximal Extra-renal: Síntese de humor aquoso (olho) e de LCR
Efeitos	Diminui reabsorção de HCO ₃ e Na Alcaliniza urina
Mecanismo de ação	Inibição da enzima AC -- ligam-se e inativam, no lado luminal, inibe a reabsorção de HCO ₃
Indicações	tx do glaucoma: aplicação tópica com gotas Traumatismo craniano com perda de LCR Distúrbios de altitude (acidifica LCR » aumenta freq Resp por estimulação central) Prevenir litíase renal por cisteína e ácido úrico (formação de cristais com pH baixo)

Inibidores Anidrase Carbónica (cont)	
Efeitos adversos	acidose metabólica por perda de HCO ₃ -- hiperclorémia Risco de litíase por fosfato e Ca hipocalemia: +Na e H ₂ O no Ducto coletor » + secreção de K
Doses muito elevadas: sx neurológicos como parestesias e sonolência contraindicado em doentes cirróticos por risco de hiperamoniémia e encefalopatia	

Diuréticos de Ansa	
Local de ação	Porção ascendente da ansa: sistema de co-transporte Na-2Cl-K
Efeitos	Promovem a Excreção urinária de Na e Cl: inibem o co-transporte; Aumentam excreção de Mg e Ca Aumentam excreção de K Secreção de prostaglandinas vasodilatadoras no rim
Mecanismo de ação	Diretamente relacionado com a secreção no TCP Liga-se ao co-transportador no local do Cl
Indicações	HTA Hipercalémia Edemas



Diuréticos de Ansa (cont)

Efeitos adversos Alcalose por hipocalcemia
Hipomagnesemia
hipocalcemia
ototoxicidade
alergia cruzada a sulfonamidas com risco de nefrite intersticial

Contra-indicações Doentes desidratados ou hipovolêmicos

administração oral (normalmente) ou IV em urgências (leva a vasodilatação da circulação venosa, com diminuição do retorno venoso)

Tiazidas

Local de ação TCD

Efeitos Promove Excreção urinária de Na e Cl
Aumentam excreção de Mg
Diminui a excreção urinária de Ca

Mecanismo de ação Ligação ao transportador Na-Cl
Inibição parcial da anidrase carbônica *

Indicações 1ª linha na HTA
Controlo da hipercalcúria

Efeitos adversos

Contraindicações IR: perdem efeito diurético e natriurético quando a TFG está muito baixa

* interferem no transporte de Na nos túbulos proximais

Poupadores de potássio

Local de ação TCD, sensível à aldosterona

Efeitos 1) inibem a reabsorção de sódio» reduz o gradiente negativo» diminui secreção de K
2) reduzem a secreção de K e a reabsorção de Na

Mecanismo de ação 1) bloqueiam canais de sódio
2) antagonistas competitivos da aldosterona

Indicações HTA
Edemas
Doentes predispostos a desenvolver hipocalcemia
Amilorida: Diabetes insipidus nefrogénica por lítio (impede a sua entrada nas células)
2) hiperaldosteronismo

Efeitos Adversos Hipercalémia
--com risco de arritmias
Nefrotoxicidade com deposição de cristais do fármaco (triantereno)
EspironoL: ginecomastia, impotência

Efeito natriurético deste grupo é ligeiro
Geralmente usado em associação a outros grupos, de forma a diminuir a depleção de K observada
2) diminuem mortalidade pós-EAM (inibem a remodelação); Espironolactona: pode ser usada pelos efeitos anti-androgénicos: SOPQ

Aquaréticos

Antagonistas da ADH
Promovem a maior excreção de água pela urina, sem aumentarem a excreção de Na -- indicados em: hiponatremias eu/hipervolémicas
!! edemas associados a cirrose, IC descompensada

Toxicidade

Hipocalcemia *Tiazidas* espoliação de K
Dose dependente
Maior [] Na e H2O nos locais de secreção de K
+ aldosterona

Ansa Perda de K determinada pela perda de H2O e hiperaldosteronismo

Consequências Arritmias
Aumento da excreção da Mg

Hiponatremia *Tiazidas* muito comum
não afetam capacidade de concentração do rim

Ansa mais raro
dissipam gradiente osmótico: comprometem concentração e diluição

Perda Vol *extracel* Agravamento da hipovolémia intravascular
disfunção renal
Hipotensão postural
Hiperativação simpática

Toxicidade (cont)

Alcalose metabólica *Tiazidas e ansa* Urina ácida (pobre em bicarbonato); Perda de Volume -- reabsorção Na e HCO₃ -- eixo RAA » secr. H⁺ e K Hipocalémia -- +amônia e +reabsorção HCO₃

Metabolismo Glicose Nas tiazidas, dose-dependente Relação com hipocalémia e compromisso da libertação de insulina pouca relevancia longo prazo

Lípidos *Tiazidas* aumento LDL e triglicerídeos; reduz HDL -- pouca relevancia a longo prazo

Toxicidade (cont)

ácido *T. e Ansa* Hiperuricémia: úrico competem com o AU na excreção no TCP + promovem a sua reabsorção RARO aparecer artrite gotosa, maioria assintomáticos

Outros: ototoxicidade (diuréticos de ansa), mais comum em doentes com cirrose e IR associado a doses elevadas em infusão rápida: agravado na adm concomitante de: aminoglicosídeos, cisplatina, etc Deficiências nutritivas (ex tiamina) » tx prolongado com furosemida Mialgias » D. de ansa, nomeadamente bumetanida



By **Beatriz_A_O**
cheatography.com/beatriz-a-o/

Published 10th April, 2022.
Last updated 10th April, 2022.
Page 3 of 3.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopad.com>