

CAVIDAD ORAL

ENFERMEDADES DE LOS DIENTES Y DE SUS ESTRUCTURAS DE SOPORTE: -caries: deterioro dental causado por la desmineralización focal de la estructura del diente por productos ácidos de la permeación bacteriana del azúcar. -gingivitis: inflamación de la mucosa oral a causa de el cúmulo de placa dental, puede ocurrir a cualquier edad, es más frecuente en la adolescencia. -peridontitis: proceso inflamatorio que afecta a estructuras de soporte de los dientes, al hueso alveolar y al cemento	LESIONES INFLAMATORIAS: -ulceras aftosas o aftas: son más frecuentes en las dos primeras décadas de vida, aparecen como úlceras mucosas hiperémicas únicas o múltiples cubiertas por exudado fino y delimitadas por eritema -lesiones fibrosas proliferativas: -fibroma traumático: masa nodular submucosa que se genera por traumatismos en repetición -granuloma piógeno: lesión inflamatoria de crecimiento rápido, es un omangioma, es de color rojo/violeta, genera úlceras con frecuencia, histológicamente son proliferación de tejido e granulación organizado vascular. :
---	--

CAVIDAD ORAL (cont)

LESION POR INFECCIONES: -herpes simple: lesiones en forma vesiculada frecuentes en niños, se conoce como faringitis en adultos e infección mucocutánea en pacientes inmunocomprometidos, la mayoría son causadas por el virus herpes simple de tipo 1 (VHS-1) pero también ocurren infecciones orales/genitales por el tipo 2 (VHS-2). puede avanzar y comprometer la mucosa intestinal (gingivostomatitis herpética aguda). test de tzanck. -candidiasis oral: es una enfermedad micótica oportunista, puede ser pseudomembranosa (membrana inflamatoria superficial, de color gris a blanco, se puede raspar fácilmente) eritematosa o hiperplásica. -micosis profundas: asporosis, histoplasmosis. --leucoplasia vellosa: lesión en el borde lateral de la lengua causada por VEB/EPSTEIN BARR, hiperplasia endotelial. -eritropiasia: lesión precancerosa asociada al tabaco, área roja aterciopelada y erosionada. -leucoplasia: placa blanca que no se puede desprender, no se puede clasificar como otra enfermedad	LESIONES CANCEROSAS: -Carcinoma escamocelular: precedido de lesiones pre-malignas se asocia al consumo de tabaco, radiación o infección por VIH, genera placas elevadas, mucosa engrosada, masas ulceradas y bordes irregulares.
--	--

CAVIDAD ORAL (cont)

QUISTES: -quiste dentigeno: se origina en la corona del diente no erupcionado, como resultado de la acumulacion de liquido entre el diente en desarrollo y el folículo dentario. -queratociste: es agresivo a nivel local, genera una capa delgada de epitelio escamoso estratificado, se expande agresivamente, se considera un tumor. -quiste radicular: lesion inflamatoria que se localiza en el vertice del diente, se desarrolla como resultado de una inflamacion prolongada del diente, puede producir necrosis	tumores: -ameloblastoma: surge del epitelio odontogeno, es quistico de crecimiento lento y localmente invasivo, evolucion indolente, es maligno. -odontoma: depositos de esmalte y dentina, representan hamartomas en su mayoria.
---	---

CAVIDAD ORAL (cont)

NEOPLASIA GLANDULA SALIVAL: frecuentes en adultos y en la glandula parotida, son generalmente benignos. a medida que la glandula es mas pequeña el tumor es mas infrecuente, pero, mas probable que sea maligno. -adenoma pleomorfo: neoplasia mas frecuente, es una masa movil bien delimitada de crecimiento lento. -tumor mixto maligno: llamado carcinoma ex-adenoma pleomorfo se caracteriza por nodulos encapsulados, por tener componente mesenquimal y epitelial, areas condromatoides que asemejan cartilago. -tumor warthin: solo se presenta en la glandula parotida, es asociado a fumadores, se caracteriza por estructuras epiteliales sobre el estroma y fondo linfoides. -carcinoma mucoepidermoide: es maligno con componente mucinoso y escamoso (mixto) es el mas frecuente, de consistencia solida, si tiene un comportamiento mas escamoso se considera mas agresivo, se divide en bajo grado (invasion local con RARA metastasis) y alto grado (invasivo) - carcinoma adenoquistico: crecimiento lento con diseminacion a hueso e higado, tiene un patrón adenoide. -carcinoma celular acinar; esta principalmente en la glandula parotida

DIARREA

es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años, uno de los problemas de salud publica mas graves en paises en via de desarrollo. es una alteracion en el habito intestinal, las heces se vuelven mas blandas, voluminosas y aumenta su frecuencia con urgencia. se da por la perdida de equilibrio entre ingestion y secrecion	MECANISMOS: 1. motilidad alterada: alteracion peristaltica y de la motilidad intestinal. 2. mala absorcion: esteatorrea. 3. osmotica: mas de 500cc de heces que disminuyen con el ayuno, laxantes osmoticos y exceso de carbohidratos liquidos, causada por deficiencia de disacaridasa se trata con lactasa y es causada por la mala absorcion de acidos biliares. 4. secretora: mas de 500cc de heces, la secrecion es isotonica y persiste con el ayuno, la mucosa intestinal secreta liquidos excesivamente que sobrepasa los mecanismos de absorcion
---	---



DIARREA (cont)

infecciosa: por rotavirus, calicivirus, adenovirus entericos. infecciones mediada por enterotoxinas: vibrio cholerae, e coli, bacillus cereus, clostridium perfringens. neoplasias: mediado por hormonas como la serotonina, si no es mediado por hormonas es un adenoma vellosa de colon distal, la clinica depende del tiempo de evolucion y nivel de deshidratacion.	CLASIFICACION: -segun tiempo de evolucion: aguda (menos de 14 dias) subaguda (2-3 semanas) cronica (mas de 4 semanas) es importante tener en cuenta el inicio, la duracion, la severidad y la consistencia
---	--

DIARREA (cont)

NO INFLAMATORIA: es acuosa y es la mas frecuente por causa viral, sin sangre, deposiciones liquidas, es autolimitante INFLAMATORIA: deposiciones con sangre, moco, pus, frecuente por bacterias, genera dolor abdominal intenso	se diagnostica con clinica, pcr, endoscopia o cultivos
---	--

DIARREA (cont)

ENTEROCULITIS INFECCIOSA: se da en niños menores de 5 años, es infrecuente y no se identifica agente causal, se da por causas infecciosas como e coli y virus como rotavirus, adenovirus	GASTROENTERITIS ROTAVIRUS: las vellosidades de atrofian y se tapizan de celulas secretoras COLITIS PSEUDO MEMBRANOSA: toxinas A y B de la clostridium difficile, induce a apoptosis de celulas epiteliales, forman pseudomembranas en la mucosa
--	---



By cats<3 (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
 Last updated 11th September, 2022.
 Page 3 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
 Measure your website readability!
<https://readable.com>

DIARREA (cont)

TRATAMIENTO: rehidratacion, antibioticos, terapias antisecretoras y prebioticos

ENFERMEDAD APENDICULAR

apendicitis aguda: se inicia por aumentos en la presión intraluminal que afecta al flujo venoso, los vasos subserosos están congestionados y existe un moderado infiltrado neutrófilo perivascular dentro de todas las capas de la pared. La reacción inflamatoria transforma la serosa brillante normal en una superficie eritematosa, granular y opaca. El diagnóstico de apendicitis aguda requiere una infiltración por neutrófilos de la muscular propia. produce un dolor periumbilical que se localiza en la fosa iliaca derecha, seguido de náuseas y vómitos

TUMORES: el más frecuente es el neuroendocrino bien diferenciado, también pueden aparecer adenomas convencionales, adenocarcinomas productores y no productores de mucina (la mucina puede disecar y provocar ruptura apendicular)

-El tumor más frecuente del apéndice es el tumor neuroendocrino (carcinoide) bien diferenciado, que casi siempre es benigno.
-• La diseminación peritoneal de las neoplasias mucinosas puede provocar un pseudomixoma peritoneal.

CAVIDAD PERITONEAL

ENFERMEDAD INFLAMATORIA: llamada peritonitis, puede ser consecuencia de una invasión bacteriana o irritación química. -infección peritoneal: se produce cuando las bacterias de la luz del gastro intestinal son liberadas en la cavidad abdominal, usualmente luego de una perforación intestinal, genera respuesta inflamatoria, puede formar abscesos hepáticos y subdiafrágmaticos.

retroperitonitis esclerosante: llamada enfermedad de ormond se caracteriza por una fibrosis densa que se extiende hasta afectar el mesenterio, se desconocen sus causas



CAVIDAD PERITONEAL (cont)

TUMOR: MESOTELIOMAS, usualmente se relacionan a altos niveles de asbesto, el mas frecuente es el tumor desmoplásico de células redondas pequeñas, aparece en niños y adultos jóvenes

HIPERTENSION PORTAL Y CIRROSIS

<p>CIRROSIS: es una enfermedad irreversible, causa fibrosis de el hígado producida por procesos inflamatorios crónicos, se genera cuando hay un daño crónico que supera la capacidad de regeneración del hígado, sus principales causas son el alcohol, la hepatitis vírica. morfología: formación de tabiques en puentes que alteran la arquitectura del hígado haciendo que pierda su función. fisiopatología: las células quecientos producen colágeno tipo 4 en el hígado, cuando hay daño hepático estas células se convierten en fibroblastos y producen colágeno tipo 1 y 2, formando puentes de colágeno entre espacios porta, haciendo que se pierda la arquitectura. clínica: anorexia, pérdida de peso y debilidad, signos/síntomas de insuficiencia hepática y síndrome hepatopulmonar.</p>	<p>HIPERTENSION PORTAL: la porta desemboca en el hígado, si este pierde su estructura se dificulta el paso de sangre, causando un aumento de presión en el sistema venoso portal, hay diferentes causas, pre hepáticas (trombosis obstructiva, esplenomegalia masiva, que es el aumento del tamaño del bazo) intrahepáticas (la mas frecuente es la cirrosis y la hipertensión nodular regenerativa) y posthepáticas (asociadas a trombosis de las venas suprahepáticas, membrana en VCI) consecuencias clínicas: ascitis (acumulación de líquido en el abdomen) formación de derivaciones venosas portosistémicas, esplenomegalia congestiva, encefalopatía hepática (por no metabolismo del amoníaco producido por la microbiota, el amoníaco se digiere en el hígado)</p>
--	---

HIPERTENSION PORTAL Y CIRROSIS (cont)

todo paciente con hepatitis crónica está en riesgo de adquirir carcinoma hepatocelular

TUBO DIGESTIVO/esofago

TUBO DIGESTIVO: es un tubo hueco el cual se extiende desde la boca hasta el orificio anal, consta de segmentos distintos formados por esofago, estomago, intestino delgado, colon, recto y ano.

ANOMALIAS CONGENITAS: -atresia, fistulas y duplicaciones: en la atresia no se forma un segmento del esofago, lo que deja un cordón delgado sin canalizar que provoca obstrucción mecánica, la **ESTENOSIS** es una forma incompleta de la atresia, en la que el calibre de la luz se encuentra reducido ya que se engruesa la pared, lo que se traduce en una obstrucción parcial o completa. -hernia diafragmática onfalocèle: aparece cuando la formación incompleta del diafragma permite que las vísceras abdominales se hernien a la cavidad torácica, el onfalocèle ocurre cuando el intestino extraembrionario no regresa a la cavidad abdominal, es decir, el cierre de la musculatura abdominal es incompleto debido a que el intestino protuye de esta. -gastroquiasis: es similar a onfalocèle, pero afecta a todas las capas de la pared abdominal. -ectopia: nodulos de tejidos ectopicos/restos de desarrollo, son asintomaticos, pero provocan daño e inflamación local, el sitio más frecuente es el tracto superior del esofago, donde se denomina parche esofágico, puede llevar a esofago de barret. -divertículo de meckel: evaginación ciega del tubo digestivo, se forma una bolsa ciega, se produce por un fallo en la involución del conducto vitelino. -estenosis pilórica: puede ser congénita o adquirida, es

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

ESOFAGO: -obstrucción esofágica: esofago en cascánueces (obstrucción funcional del esofago por contracciones intensas, el tránsito puede ser normal o presentar regiones estrechas en forma de cascánueces) espasmo esofágico difuso (contracciones repetidas y simultáneas, son de amplitud normal). -acalasia: relajación incompleta del esfínter esofágico, aumento del tono del esfínter esofágico y aperistaltismo, presenta disfagia dolor torácico y dificultad para eructar, se divide en alacasia primaria (es infrecuente, causada por la degeneración de neuronas productoras de óxido nítrico que provocan relajación del esfínter) alacasia secundaria (puede aparecer en la enfermedad de chagas ya que puede producir destrucción del plexo mientérico, dilatación esofágica y falla del peristaltismo)

ESOFAGITIS: -desgarros: denominados desgarros de Mallory-Weiss, relacionados con arcadas/vómito seguido a una intoxicación aguda de alcohol, la relajación falla durante los vómitos prolongados, lo que provoca reflujo del contenido gástrico. -esofagitis por reflujo: el reflujo se dirige a la parte inferior del esofago. esofagitis eosinofílica: inflamación esofágica aguda con predominio de eosinófilos asociada a enfermedad atópica, los pacientes presentan disfagia y vómito, el esofago adopta aspecto de anillos apilados.

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

ESOFAGO DE BARRET: es una de las complicaciones de la esofagitis por reflujo crónica, caracterizada por una metaplasia intestinal dentro de la mucosa escamosa esofágica, se asocia con riesgo de cáncer (adenocarcinoma esofágico) se presenta como mucosa roja aterciopelada metaplasia con mucosa escamosa de color amarillo/pardo

una masa abdominal dura, ovoide. enfermedad de hirschprung: obstruccion funcional del colon, el diagnostico se basa en la confirmacion de la ausencia de celulas ganglionares en el segmento afectado, se manifiesta con un fallo en la eliminacion de meconio en el periodo prenatal, luego aparece un estreñimiento/obstruccion con peristaltismo visible, se caracteriza por distencion abdominal y vomitos biliosos



By **cats<3** (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 6 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

displasia: se clasifica en leve o grave, en ambos casos se encuentran mitosis atípicas

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

LESIONES NEOPLASICAS: la mayoría de tumores esofágicos son adenocarcinomas o carcinomas epidermoides.

ADENOCARCINOMA: se origina por esófago de Barrett o ERGE de larga duración, suele aparecer en el tercio distal del esófago, inicialmente aparece como parches planos o elevados en una mucosa precancerosa, puede crecer hasta generar grandes masas de 5cm o más, pueden infiltrar de manera difusa o ulcerarse e invadir en profundidad, a nivel histológico forman glándulas. En cuanto a características clínicas los pacientes presentan dolor/dificultad para tragar, pérdida de peso, hematemesis, vómito. Generalmente causado por la mutación de TP53, CDKN2A

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

CARCINOMA EPIDERMÓIDE: asociado a la mutación de TP53, CDH1, aparece en el tercio medio del esófago, comienza como una lesión in situ (displasia escamosa) las primeras lesiones aparecen como engrosamiento en forma de placa blancas/grisáceas que con el tiempo se pueden convertir en masas tumorales que obstruyen la luz, es de aparición lenta los pacientes suelen presentar disfagia, odinofagia (dolor al tragar) u obstrucción en el momento de la presentación y pueden haberse adaptado sin saberlo a la obstrucción esofágica progresiva modificando la dieta, pasando de sólidos a líquidos, resulta en adelgazamiento y debilitamiento



By cats<3 (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
 Last updated 11th September, 2022.
 Page 7 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
 Measure your website readability!
<https://readable.com>

TUBO DIGESTIVO/esofago (cont)

CONCEPTOS CLAVE: alteraciones de motilidad esofagica-esofago en cascaneas y espasmo difuso. acalasia-relajacion incompleta del esfinter. causa mas frecuente de esofagitis-ERGE(reflujo de acido gastrico hacia el esofago) las varices esofagicas estan relacionadas con la hipertension portal y aparecen en pacientes con cirrosis. el adenocarcinoma epidermoide se asocia con el consumo de alcohol, abuso de tabaco, alcalasia y sindrome de plummer-vinson

INTESTINO DELGADO/COLON

INTESTINO DELGADO/COLON (cont)

ANGIODISPLASIA: se caracteriza por una malformacion de los vasos sanguineos mucosos o submucosos que presentan dilatacion y par4edees delgadas, se caracteriza por nidos ectasicos de venas	INFARTO INTESTINAL: en pacientes ancianos o en reposo prolongado, la lesion inicial es isquemica por reperfusion, luego se reestablece la irrigacion generando inflamacion produciendo radicales libres en mucosa. -angiodisplacia: malformaciones vasculares. -hemorroides: dilataciones varicosas de los paquetes hemorroidales, generan dolor y sangrado
---	---

OBSTRUCCION: - hernias: protusión de una bolsa del peritoneo, debido a cualquier debilidad/defecto en la pared abdominal. - adherencias: causada por inflamación peritoneal, ya sea por intervenciones quirúrgicas o infección provoca adherencias entre los segmentos intestinales, la pared abdominal o los sitios quirúrgicos, se forman puentes fibrosos que pueden crear asas cerradas por las cuales las vísceras pueden deslizarse y quedar atrapadas, lo que lleva a una hernia interna. - invaginación: se produce cuando un segmento del intestino construido por una onda de peristaltismo se pliega, una vez atrapado el segmento invaginado el peristaltismo lo empuja generando un jalón del mesenterio, puede evolucionar a compresión de los vasos mesentéricos e infarto. es frecuente en menores de 2 años, se asocia con la vacuna del rotavirus -volvulo: aparece cuando un asa del intestino se retuerce alrededor de sí misma, es infrecuente	ENFERMEDAD ISQUEMICA INTESTINAL: En una gran mayoría de los casos, la obstrucción aguda está producida por trombosis o embolia. El factor de riesgo más importante de trombosis es la aterosclerosis grave. Los émbolos obstructivos se originan con mayor frecuencia a partir de ateromas aórticos o trombos cardíacos parietales. La trombosis venosa mesentérica, puede deberse a estados de hipercoagulabilidad heredados o adquiridos, neoplasias invasivas, cirrosis, traumatismos o masas abdominales que comprimen el drenaje portal. La hipoperfusión intestinal también puede aparecer en ausencia de obstrucción vascular en el contexto de insuficiencia cardíaca, shock, deshidratación o uso de fármacos vasoconstrictores. Normalmente, la isquemia aguda del colon se manifiesta con la aparición repentina de un dolor abdominal cólico en la fosa ilíaca izquierda, deseo de defecar y expulsión de sangre o diarrea hemorrágica
---	--



By **cats<3** (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 8 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

INTESTINO DELGADO/COLON (cont)

ENFERMEDAD DE DIVERTICULAR: el divertículo es un saco ciego recubierto por mucosa que sobresale de la pared intestinal y comunica con la luz, genera dolor abdominal y tenesmo del recto, el divertículo suele salir sobre el borde mesentérico, suelen salir hacia la grasa

ENFERMEDAD DE CROHN: puede aparecer en cualquier área del tubo digestivo, se limita al intestino delgado, genera lesiones salteadas, inicia con una úlcera aftosa, que puede evolucionar. en la mayoría de pacientes la primera manifestación son crisis intermitentes de diarrea leve acompañada de fiebre y dolor abdominal, puede generar nódulos cutáneos formados por granulomas, es una enfermedad que avanza rápidamente, puede generar fístulas o perforaciones, macroscopia: úlceras, fístulas en parches y fisuras, microscopia: pérdida de la arquitectura, formación de granulomas no caseificantes, inflamación aguda, abscesos cripticos

INTESTINO DELGADO/COLON (cont)

COLITIS ULCERATIVA: compromiso superficial limitado a mucosa y submucosa, compromiso del recto. su afección se limita a colon y recto. las lesiones extraintestinales constan de poliartritis migratoria, sacroilitis, uveitis y lesiones cutáneas, la pared del colon NO se engruesa, no se producen estenosis, clínica: crisis de diarrea hemorrágica con material mucoide fibroso, dolor abdominal y cólicos que se alivian temporalmente con la defecación

NEOPLASIAS: pueden aparecer gracias a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, - polipos: hiperplásicos (proliferaciones epiteliales benignas, resultantes del recambio de células epiteliales y un retraso en el desprendimiento de las células epiteliales se encuentran con mayor frecuencia en el colon descendente y suelen medir menos de 5mm, se componen de células calcificadas. -síndrome de Peutz-Jeghers: síndrome autosómico dominante que se presenta a una edad promedio de 11 años, se manifiesta con múltiples polipos hamartomatosos digestivos e hiperpigmentación mucocutánea, adopta la fórmula de maculas de color azul/marrón en los labios, orificios nasales, mucosa bucal, superficies palmares de las manos, los genitales y la región perianal, los polipos de esta enfermedad pueden iniciar una invaginación intestinal que en ocasiones puede llegar a ser mortal, frecuente en el intestino delgado, a nivel macroscópico se evidencian polipos grandes y pediculados con contorno lobulado

INTESTINO DELGADO/COLON (cont)

CÁNCER COLORECTAL HEREDITARIO NO POLIPOSOM: se produce por mutaciones hereditarias en genes de reparación de errores de emparejamiento que ocurren durante la replicación de ADN.

ADENOCARCINOMA: neoplasia maligna más frecuente, usualmente los que crecen en la porción proximal crecen como masas exofíticas polipoideas, por el contrario los de la porción distal tienden a ser lesiones anulares que producen estenosis en ANILLO DE SERVILETA y estrechamiento luminal



By **cats<3** (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 9 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

INTESTINO DELGADO/COLON (cont)

NOTAS: -Casi todos los cánceres de colon son adenocarcinomas. Los dos factores pronósticos más importantes son la profundidad de la invasión y la presencia o ausencia de metástasis ganglionares.

ESTOMAGO

ESTOMAGO (cont)

GASTRO-
PATIA: -enfermedad ulcerosa peptida:
inflam- erosión de la mucosa, puede
ación de comprometer mucosa y sub-
la mucosa mucosa, relacionada a helico-
pero las bacter pylori, pacientes con
celulas epoc, cigarrillo y síndrome de
inflam- zollinger-edinson (tumor
atorias secretor de gastrina en el
son pancreas) suele ser: bien
infrecuen- delimitada, menor a 0,3 cm, de
tes/no se profundidad variable con base
encuen- limpia y lisa. produce
tran, sus telomeros cicatrizantes
causas dejando zonas de estenosis,
mas es infrecuentemente maligna,
habituales histología: inflamación crónica,
son la necrosis, cuadro clínico: ardor
bilis, el epigástrico, dolor continuo que
consumo empeora en la noche o 3
de alcohol. horas después de las
puede ser comidas, dolor irradiado a la
asinto- espalda, hipocondrio izquierdo
matica o o torax, vómitos, náuseas,
relaci- eructos si hay pérdida de peso
onarse a indica neoplasia maligna, rx:
dolor sombra negra entre el
epigas- diafragma y el neumoperit-
trico, oneo. es una úlcera crónica de
nausea- la mucosa que afecta al
s/vomito duodeno o al estomago,
genera metaplasia foveolar

GASTRITIS: -	gastritis quística:
aguda: inflamación	proliferación epitelial
de la mucosa	reactiva, atrapa-
gástrica, tiene	miento de quistes
neutrófilos	por epitelio,
presentes, se	inducida por
asocia con dolor	traumatismo previo.
epigástrico y	- gástrapatías
náuseas o vómito. -	hipertroficas:
gastritis quística:	agrandamiento de
proliferación epitelial	los pliegues de la
reactiva, atrapa-	mucosa, es infrec-
miento de quistes	uente y se caract-
por epitelio,	eriza por pliegues
inducida por	frondosos causados
traumatismo previo.	por secreción
- gástrapatías	excesiva de TGP-
hipertroficas:	alfa (factor de
agrandamiento de	crecimiento) genera
los pliegues de la	edema en las
mucosa, es infrec-	extremidades e
uente y se caract-	hiperplasia foveolar
eriza por pliegues	gastritis linfocítica:
frondosos causados	esta relacionada a
por secreción	la enfermedad
excesiva de TGP-	celíaca (síndrome
alfa (factor de	de malabsorción)
crecimiento) genera	infiltrado de
edema en las	linfocitos en la
extremidades e	mucosa. -gastritis
hiperplasia foveolar	granulomatosa:
gastritis linfocítica:	granulomas en la
esta relacionada a	lámina propia,
la enfermedad	principal causa
celíaca (síndrome	infecciosa es tbc,
de malabsorción)	hongos y cmb, son
infiltrado de	idiopáticas y relaci-
linfocitos en la	onadas a
mucosa. -gastritis	enfermedad de
granulomatosa:	crohn (colitis
granulomas en la	ulcerativa, se
lámina propia,	inflama el intestino)
principal causa	puede ser causada
infecciosa es tbc,	por reacción a un
hongos y cmb, son	cuerpo extraño
idiopáticas y relaci-	síndrome Zollin-
onadas a	ger-Ellison: se debe
enfermedad de	a tumores
crohn (colitis	secretores de
ulcerativa, se	gástrica, generan
inflama el intestino)	úlceras duodenales
puede ser causada	y diarrea crónica,
por reacción a un	aumento de células
cuerpo extraño	peritales
síndrome	



By **cats3** (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 10 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

ESTOMAGO (cont)

A medida que progresa el daño, las erosiones, es decir, las lesiones superficiales de la mucosa, se acompañan de infiltrados neutrófilos y exudado que contiene fibrina dentro de la luz. La hemorragia puede ocasionar puntos oscuros dentro de la mucosa hiperémica. La erosión y la hemorragia coinciden se denominan gastritis hemorrágica erosiva aguda.

GASTRITIS CRONICA: se produce con mayor frecuencia por infección por *H. pylori*. - gastritis atrofica autoinmunitaria: suele acompañarse de hipergastrinemia, se caracteriza por AC contra celulas parietales y factor intrínseco, hiperplasia de celulas endocrinas, deficiencia B12 y secrecion defectuosa de acido gastrico. se asocia con la perdida de celulas parietales, responsables de la secrecion del acido dastrico y factor intrínseco, la ausencia de la liberacion de acido aumenta la liberacion de gastrina que provoca hipergastrinemia e hiperplasia de celulas G, La pérdida de factor intrínseco da lugar a una absorción ileal defectuosa de vitamina B12, que, en última instancia, conduce a una deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. se caracteriza por un daño difuso a la mucosa oxintrica, dentro del cuerpo, con la ATROFIA la mucosa aparece notablemente adelgazada y lisa (se pierden los pliegues rugosos)

ESTOMAGO (cont)

-polipos no neoplasicos: corresponden al 90% son los polipos hipoplásicos, de glandulas fundicas, fibrosos inflamatorios y peutz segheis (hamartoma) - polipos neoplasicos; adenomas (con displasia de bajo grado) con alta probabilidad de malignidad, corresponden al 10%, los polipos son a causa de gastritis cronica, debido a que genera una hiperplasia reactiva que lleva al crecimiento del polipo

POLIPOS: -polipos hiperplásicos: se correlacionan con infección con *H. pylori*, frecuentes en personas 50-60 años y suelen asociarse a gastritis cronica, inicia la lesion que conduce a hiperplasia reactiva y crecimiento del polipo, mide menos de 1 cm de diametro, frecuentemente son multiple. -polipos de glandulas fundicas: su incidencia es mayor en pacientes con PAF, se relaciona con pacientes con gastritis cronica atrofica con metaplasia intestinal. genera epitelio metaplasico proliferativo, s son sesiles aparecen de porma esporadica y en personas con mutaciones germinales del gen APC, KRAS, P53 estan asociados a el uso de inhibidores de la bomba de protones que conduce a una mayor secrecion de gastrina, suelen aparecer en el cuerpo y el fondo gátrico, son lesiones bien delimitadas con superficie lisa. -polipos gastricos: nodulos o masas por encima de la mucosa, puede ser pediculado o sesil, se descubren como hallazgos incidentales, como consecuencia generan hiperplasia, inflamacion, ectopia y neoplasia.

ESTOMAGO (cont)

TUMORES: -adenocarcinoma gastrico: produce displasia, se genera por el consumo de alimentos salados, ahumados, picantes, infección por *H. pylori*, gastritis cronica. son esporadicos, por componentes geneticos como grupo sanguineo A, prevalece en la zona del antro, el difuso se identifica por lesiones precursoras (el difuso presenta celulas en anillo de sello) los indicadores pronosticos dependen de la profundidad de la invasion. - adenocarcinoma gastrico: se divide en intestinal (tiende a formar masas voluminosas) y tipo difuso (infiltra y engruesa la pared)

- **TUMOR DE KRUKENBERG:** adenocarcinoma gastrico con metastasis ovarica (metastasisico bilateral)

LINFOMAS: -MALT: linfomas de tejido linfocitario asociado a mucosas, se dividen en celulas grandes (mas frecuentes) y celulas pequeñas Los síntomas de presentación más frecuentes son dispepsia y dolor epigástrico. También pueden aparecer hematemesis, melenas y síntomas inespecíficos, como adelgazamiento



By **cats3** (M_catalinarm)
cheatography.com/m-catalinarm/

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 11 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>

ESTOMAGO (cont)

TUMOR NEUROENDOCRINO: se generan a partir de los componentes difusos del sistema endocrino, se asocian con hiperplasia de células neuroendocrinas, los síntomas dependen de las hormonas producidas, a nivel macroscópico son masas intraparietales/submucosas tienden a ser de color amarillo/pardo, histológicamente son bien delimitados compuestos de islotes, trabéculas, glándulas y células de escaso citoplasma granular rosa y núcleo redondo, localización: en colon no son agresivos, en el estómago tienen agresividad intermedia y en el intestino delgado son los más agresivos. inmunohisto: cromogranina-a y sinaptosina	TUMOR ESTROMA GASTROINTESTINAL: (GIST) es el tumor mesenquimal más frecuente de abdomen, la diseminación fuera de abdomen suele ser infrecuente, y su comportamiento depende del tamaño, inmuno histo: C-KIT, CD117. puede alcanzar los 30 cm de diámetro, suelen formar masas solitarias bien delimitadas
--	--

ESTOMAGO (cont)

NOTAS: -Los linfomas gástricos primarios son, con mayor frecuencia, tumores B de bajo grado del tejido linfoide asociado a mucosas (MALTomas) que surgen en el contexto de la gastritis crónica por H. pylori - Los adenomas gástricos aparecen en un contexto de gastritis crónica y están claramente relacionados con la metaplasia intestinal y la atrofia mucosa (glandular). - Los pólipos de las glándulas fúndicas aparecen de forma esporádica, sobre todo como consecuencia del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y en pacientes con poliposis adenomatosa familiar y poliposis asociada a MUTYH.

pancreas

componente exocrino: células acinares que producen enzimas digestivas. componente endocrino: islotes de Langerhans, secretan insulina, glucagón y somatostatina.	PANCREATITIS AGUDA: lesión REVERSIBLE del parénquima pancreático asociada a inflamación. se divide en hereditaria (se presenta en jóvenes, es de causa idiopática, consiste en ataques recurrentes de pancreatitis grave que inician en la infancia). la pancreatitis aguda consiste en la obstrucción del conducto pancreático por neoplasias, parásitos, etc, también es causada por una lesión primaria de células acinares por drogas, isquemia o trauma, lo que conduce a la liberación de proenzimas e hidrolasas. también se causa por daños en el transporte intracelular por exceso de alcohol. el daño es directamente proporcional a la exposición.
MECANISMOS DE AUTOPROTECCIÓN: proenzimas inactivas (enzimas que solo se activan en presencia de proteínas específicas) granulos de cinógeno (proenzimas contenidas) y células acinares resistentes a las enzimas	CLÍNICA: dolor abdominal, anorexia, abdomen agudo, leucocitosis, hemólisis, secuestro de líquidos, náuseas/vómito. puede dejar como secuela un absceso pancreático estéril

pancreas (cont)

PANCREATITIS CRONICA: inflamacion del pancreas con destruccion IRREVE- RSIBLE del parenquima exocrino, generando fibrosis, genera fibrosis perialveolar y fibrosis del parenquima, genera mortalidad en un 50% de los casos a los 25 años	QUISTES NO NEOPLA- SICOS: congenitos (desarrollo anomalo de los conductos pancreaticos) pseudoquistes (por secuela de pancreatitis, no tienen reveti- miento epitelial)
--	---

pancreas (cont)

CARCINOMA DE PANCREAS: ademocarcinoma ductal infiltrante del pancreas, la mayoría se desarrolla en la cabeza del pancreas, son masas duras mal delimitadas	COLETIASIS:c- alculos pigmen- tarios morados y negros y calculos de colesterol, genera colico biliar, dolor abdominal en el epicentro dueodeno
--	---



By **cats<3** (M_catalinarm)
[cheatography.com/m-
catalinarm/](https://cheatography.com/m-catalinarm/)

Published 11th September, 2022.
Last updated 11th September, 2022.
Page 13 of 100.

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
<https://readable.com>